



Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid

Algemeen inclusie criteria ACTP Voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taak (Lezen, schrijven, spreken en verstaan)	Voldaan	
	Ja	Nee
Is bereid en beschikbaar om te participeren in (groeps)therapie en metingen		
IQ > 80		
Leeftijd 18-70 jaar		
Geen verslaving die detox behoeft (waarna de participant wel toegelaten kan worden)		
Geen bipolaire-1 stoornis (wanneer minstens drie maanden volledige remissie)		
Vast woonadres		
Geen Antisociale persoonlijkheidsstoornis met geschiedenis (afgelopen twee jaar) van interpersoonlijk fysiek geweld		

Cluster C specifiek

Hoofdclassificatie (gebaseerd op de DSM-5)		
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis, of Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, of Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis, of Chronische depressie, of Chronische angststoornis		
Niet voldaan aan (sub)threshold van de borderline persoonlijkheidsstoornis (maximaal drie trekken)		
Beschikbaarheid minimaal 12 maanden		

Cluster B Specifiek

Hoofdclassificatie (gebaseerd op de DSM-5)		
Borderline persoonlijkheidsstoornis Theatrale persoonlijkheidsstoornis		
Geen actieve Psychose / psychotische stoornis (behalve wanneer dit valt onder BPS-criterium 9 van de DSM 5)		
Beschikbaarheid voor minimaal 24 maanden		

Cluster anders gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Hoofdclassificatie (gebaseerd op de DSM-5)		
Persoonlijkheidsstoornis anders gespecificeerd		
Beschikbaarheid voor minimaal 12 maanden		

In het bijzonder is er een beperkt aanbod individueel aanbod

Hoofdclassificatie (gebaseerd op de DSM-5)		
Narcistische persoonlijkheidsstoornis Paranoide persoonlijkheidsstoornis Schizoide persoonlijkheidsstoornis		
Beschikbaarheid voor minimaal 12 maanden		

Trauma in de jeugd

Hoofdclassificatie (gebaseerd op de DSM-5)		
--	--	--



Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid

Posttraumatische stressstoornis		
Chronische depressie, of Chronische angststoornis		
de ergste traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt (gedefinieerd volgens de DSM-5) vóór de leeftijd van 16 jaar en ermee instemmen dat dit trauma de focus van de behandeling zal zijn;		
ernstige neurologische problemen ervaren (bijv. dementie)		
Niet een acuut zelfmoordrisico hebben		
benzodiazepine gebruiken (na 3 weken onthouding is deelname mogelijk)		
Niet voldoen aan actuele stoornis in middelengebruik met een matige of ernstige ernst (d.w.z. meer dan vier symptomen)		